

## 登園届 (保護者記入)

\_\_\_\_\_  
施設長 殿

児童名

病 名

(

)

令和 年 月 日 医療機関名「 \_\_\_\_\_ 」において病状が回復し、  
集団生活に支障がない状態と判断されましたので登園いたします。

令和 年 月 日

保護者名

**【保護者様】**

乳幼児がよくかかる下記の感染症については、登園のめやすを参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願いします。なお、園での集団生活に適應できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
伝染性膿痂疹 (とびひ)	湿潤な発疹がある間	皮しんが乾燥しているとか、湿潤部位が覆える程度のものであること  (皮しん・痂皮が湿潤している間は、接触による感染力が認められる)
伝染性軟属腫 (水いぼ)		掻きこわし傷から、滲出液が出ているときは被覆すること
頭じらみ	発症から駆除開始し、 数日間	駆除を開始していること

\* その他：原因不明の発熱、咳、嘔吐、下痢、発疹などの症状があるとき

1. 伝染性膿痂疹（とびひ）は、擦り傷、虫刺され、あせも、アトピー性皮膚炎等の小さな傷から細菌が感染します。 感染した場合には、病院で診察を受けて正しい対応をするように、保護者にお願いします。 感染している人の膿の入った水ぶくれが潰れて、中の菌があちこちに飛び火のように広がる病気です。
2. 水いぼは、皮膚や粘膜のウイルス感染症で、完治には長い期間がかかる場合もあり、感染しても熱や特別な症状が出ないため、自然に治るのを待つ、と言う考え方と、周りの児童に伝染することを防ぐために積極的に治療すべきだ、と二つの考え方があります。

**\* 1・2に感染した場合には、全身に広がる前に受診し、医師の診断結果を保護者が記入する「登園届」の提出をお願いします。また、下記の点に留意し、ご協力をお願い致します。**

- 感染を防ぐため、膿んでいる部分が露出しないように、絆創膏や防水パッチ、ガーゼ等で覆って下さい。
- プール遊び時は、とびひや水いぼの部分が露出しないように「ラッシュガード」の着用をお願いします。
- 症状により、医師や保護者と相談した上、水遊びに変更する場合があります。

3. 頭じらみは、感染している人との直接・間接の接触やスイミングプールなどで感染する場合があります。感染に気付いたら直ぐに皮膚科へ受診し、医師の診断結果を保護者が記入する「登園届」の提出をお願いします。  
  
プール遊び開始前に各家庭でしっかりとチェックをしていただき、感染が疑われる場合は薬やシャンプーでの駆除をお願いします。園では、すぐに同じプールで遊ぶことは避けて、治療の結果を観察して、他への感染がなくなるまで、別の場所での水遊びとなります。